



Rău de mișcare pentru copii- comprimat de supt d161 20 cpr FARES

Beneficii

Are efect dovedit în reducerea senzațiilor de rău și a vărsăturilor în timpul călătoriilor cu mijloacele de transport, datorită conținutului de ghimbir

Are efect spasmolitic, datorită conținutului de fenicul și mentă

Contribuie la menținerea confortului digestiv, datorită măghiranului care are efecte calmante și antispastice

- Descriere

Comprimatetele Rău de mișcare pentru copii, D161, ajută la prevenirea senzațiilor de rău și a vărsăturilor asociate cu folosirea unui vehicul și a răului de mare.

În urma evaluării eficienței produsului s-a obținut:

- Eficiență în 88% din cazuri pentru dispariția simptomelor din răul de mișcare, confirmată clinic.
- Instalarea efectului terapeutic în 72% din cazuri după 50 minute de la administrarea unui comprimat și în 12% din cazuri după 30 de minute de la administrarea a 2 comprimate
- Toleranță și complianță de 100%.

Evaluarea eficienței a fost realizată în colaborare cu medici de familie și medici pediatrii.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 12 g

Condiții de păstrare: La loc uscat și la temperatura mediului ambiant

- Ingrediente

- Fructoză

- Extract moale de plante: rizomi de ghimbir (*Zingiberis rhizoma*) 31,4 mg, fructe de fenicul (*Foeniculi fructus*) 15,7 mg, măghiran (*Majoranae herba*) 8,6 mg, scorțișoară (*Cinnamomi cortex*)

4,3 mg

- Ulei esențial de mentă (*Menthae crispae aetheroleum*) 3 mg
- Ulei esențial de lămâie (*Citri aetheroleum*) 3 mg
- Ulei esențial de ghimbir (*Zingiberis aetheroleum*) 3 mg
- Excipienți (agent de încărcare: lactoză; agent de curgere: stearat de magneziu, aerosil).
 - Mod Administrare

Copii 3 - 5 ani: 1/2 comprimat cu 30-60 de minute înainte de a pleca în călătorie;

Copii 6 - 13 ani: 1 comprimat cu 30-60 de minute înainte de a pleca în călătorie; se repetă dacă apare răul de mișcare.

În general este suficient 1 comprimat la 4 ore. Se pot utiliza până la 8 comprimate de supt pe zi.

Atenționări:

Nu se recomandă copiilor sub 3 ani, în caz de intoleranță la lactoză și hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

Efecte secundare și interacțiuni:

Acest produs se poate utiliza concomitent cu medicamentele. La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare.